

TRATAMIENTO CON 5 FLUOROURACILO TÓPICO

Este fármaco, en su uso tópico, está indicado principalmente en el tratamiento de queratosis actínicas, lesiones que suelen aparecer en zonas expuestas al sol (cara, cabeza, cuello, zona superior del tronco, antebrazos, dorso de manos, etc.). Es un fármaco quimioterápico que cuando se aplica tópicamente (al 5%) da lugar a efectos locales.

Forma de aplicación

Aplicar una fina capa sobre las lesiones 2 veces al día (mañana y noche) durante 15-20 días

No aplicar o aplicar con precaución el producto cerca de los ojos, la nariz y la boca.

Tras la aplicación del producto, lavarse inmediatamente las manos.

Aplicar el producto durante unos 15-20 días, posteriormente hacer toques de alcohol (96^a) 2-3 veces al día durante 15 días más, hasta la desaparición de la irritación y de las lesiones costrosas.

Efectos secundarios

De forma casi constante este producto da lugar a un enrojecimiento, quemazón, dolor, molestias locales y formación de costras en la zona donde se aplica y, a menudo, también en la piel de alrededor de esta zona. En caso de que la irritación sea muy intensa, puede interrumpirse el tratamiento durante unos 2-3 días y aplicar un antiséptico tópico (como por ejemplo, Cristalmina Solución Tópica®). Pasados estos 2-3 días de interrupción del tratamiento, puede intentar reanudar la aplicación del producto. Si la irritación es muy intensa o extensa debe consultar a su dermatólogo.

En casos muy raros, el 5-FU puede dar lugar a una despigmentación de la piel sobre la que se ha aplicado

Puede ocasionar también una fotosensibilidad (mayor tendencia a sufrir quemaduras por el sol) en las zonas de aplicación. Evite la exposición al sol, a las lámparas solares y a las cabinas de bronceado.

Precauciones

Este tratamiento no puede aplicarse en embarazadas ni durante la lactancia