

ANTIBERRUGUES TÒPICS AMB ÀCID SALICÍLIC I ÀCID LÀCTIC

Hi ha diversos productes al mercat (Antiverrugas Isdinâ, Verufilâ, Quocinâ, etc.) pel tractament tòpic de les berrugues víriques. La majoria d'aquests preparats contenen substàncies queratolítiques (cremen les capes més superficials de la pell) com l'àcid làctic o l'àcid salicílic.

Forma d'aplicació

1. Llimar la berruga amb llima d'ungles (a la nit)
2. Aplicar una gota del producte amb l'espàtula sobre la berruga a tractar, evitant tocar la zona de la pell sana circumdant, per a evitar cremades sobre la pell sana. Es pot protegir la pell sana amb una pomada Pasta Lassarâ.
3. Deixar assecar.(2-3 minuts)
4. Tapar-ho amb un plàstic (cel·lofan cuina)
5. Cobrir amb esparadrap durant 8 hores (tota la nit).
6. Treure-ho tot al matí
7. Aplicar de nou el tractament cada nit fins a la caiguda de la berruga.

Quan consultar el dermatòleg?

- * Si s'observa supuració, sagnat i/o dolors persistents.
- * Quan la lesió sigui fosca (tonalitats marrons, negres) és millor no tractar-la a casa i consultar el dermatòleg
- * Quan la berruga es trobi en zones "delicades" (cara, genitals) o la pell de la zona sigui prima.
- * Quan la berruga sigui molt gran o en presenti moltes.
- * Quan no cura després de 2 mesos d'aplicació de l'antiberrugues de forma correcta.