

TRACTAMENT AMB IMIQUIMOD

Què cal saber?

Imiquimod (Aldara®) és una substància química que actua sobre el seu sistema immunològic millorant la capacitat de l'organisme per a eliminar les queratosis actíniques i alguns tipus especials de tumors cutanis (carcinomes basocel·lulars superficials). També és útil en el tractament de berrugues a la zona genital.

Durant el tractament amb la crema de l'Imiquimod es produirà una reacció inflamatòria a la zona de la lesió. Sol aparèixer: envermelliment, erosions, inflamació i irritació, i en alguns casos formació de crostes que pot estendre's per fora dels límits de la lesió tractada. A vegades pot aparèixer sensació de coïssor i/o prujia, habitualment bastant tolerable.

Aquests canvis són gairebé constants en tota persona tractada amb imiquimod i solen iniciar-se a partir de la setmana de començar el tractament.

No s'alarmi per l'aparició d'aquests símptomes. Tot això és normal i existeix una relació entre el grau d'inflamació i la taxa de curació de la lesió: com més intensa sigui la irritació de la zona tractada, millor serà la eficàcia del medicament i una irritació intensa sol indicar una probabilitat més gran que la lesió desaparegui del tot.

Aquests símptomes desapareixeran espontàniament una vegada finalitzat el tractament. Malgrat tot, si la reacció inflamatòria és molt intensa, consulti amb el seu metge per si cal interrompre el tractament uns dies.

Com s'aplica el tractament?

La crema de l'Imiquimod ha d'aplicar-se abans de ficar-se al llit.

1. Cal rentar les mans i la zona a tractar amb aigua i un sabó suau i després eixugar curosament la zona a tractar.
2. Aplicar una quantitat de crema suficient que cobreixi tota la zona de tractar.
3. Estendre la crema fins que desaparegui
4. Després d'aplicar la crema, rentar les mans amb aigua i sabó.
5. Deixi actuar la crema unes 6-8 hores (tota la nit)
6. Una vegada passades les 8 hores, elimini (amb aigua i un sabó suau) la crema de la zona tractada.
7. Si es desenvolupa una irritació important, pot interrompre's el tractament alguns dies.

Una vegada finalitzat el tractament, aplicar tocs d'alcohol 2-3 vegades al dia durant uns 15 dies fins que totes les lesions irritades i crostes desapareguin.

La freqüència d'aplicació es variable segons el procés que es tracta:

Si tractem queratosis actíniques: 3 cops a la setmana (dilluns, dimecres i divendres) durant 4 setmanes.

Si tractem carcinomes basocel·lulars superficials: 5 cops a la setmana (de dilluns a divendres) durant 6 setmanes (com a màxim 16 setmanes).

Si tractem berrugues genitals: 3 cops a la setmana (dilluns dimecres i divendres) fins la desaparició de les lesions (unes 4 setmanes, com a màxim 16 setmanes).